

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Allewyn Plus Adhesive IFU (Russian)
CODE:	N/A
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55742
PREV BSC:	N/A
DATE:	20/01/2015
REVISION:	02

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1945		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS Match to coated stock PMS	■ Black		
ARTWORK	MP	CHECKED	SG

(RU)

smith&nephew

ALLEVYN[®] PLUS ADHESIVE

Клеящаяся губчатая полиуретановая повязка

⚠ Не используйте содержимое, если упаковка открыта или повреждена.

Описание

Повязка ALLEVYN[®] Plus Adhesive объединяет в себе расположенную по центру абсорбирующую губчатую прокладку, размещенную между перфорированным клейким слоем для контакта с раной и водонепроницаемой внешней пленкой.

Механизм действия

Повязка ALLEVYN Plus Adhesive помогает обеспечить влажную среду в ране. Повязку легко накладывать и снимать.

Показания

Лечение ран вторичным натяжением при неглубоких гранулирующих ранах с уровнем экссудата от высокого до сверхвысокого. Хронические и острые экссудативные раны, а также полнослойные и неполнослойные раны, такие как пролежневые язвы, язвы ног, инфицированные раны, язвы при синдроме диабетической стопы, злокачественные раны, хирургические раны, ожоги первой и второй степени, донорские участки и разрастающиеся язвы с некрозом. Может использоваться вместе с гелем INTRASITE[®] для некротических или струпных ран.

Инструкция по применению

1. Очистите рану в соответствии со стандартной процедурой.
2. Выберите повязку соответствующего размера.
3. Подготовьте и очистите кожу вокруг области раны, удалив лишнюю влагу. Лишние волосы должны быть обрезаны, чтобы обеспечить прилегание к ране. При слабой коже перед наложением повязки ALLEVYN Plus Adhesive могут использоваться салфетки SKIN-PREP[®].
4. Начните снимать защитный материал с повязки ALLEVYN Plus Adhesive и зафиксируйте повязку.
5. Расправьте повязку на ране, снимая защитный материал.
6. Повязку ALLEVYN Plus Adhesive можно разрезать, в особенности для применения на ранах, расположенных на пятках, локтях и в других неудобных местах.

7. Располагая повязку ALLEVYN Adhesive Sacrum, поместите узкий конец повязки на расстояние как минимум 2 см (3/4 дюйма) над анальным сфинктером, а затем расправьте повязку по крестцу.

Частота смены

На ранних стадиях лечения ран необходимо часто проверять повязку ALLEVYN Plus Adhesive. Если продукт применяется на инфицированных ранах, раны должны проверяться и обрабатываться в соответствии с местным клиническим протоколом. Повязки могут оставаться на месте до семи дней, за исключением крестцовой области, где они могут оставаться до пяти дней, или пока экссудат не станет видимым и не достигнет 2 см (3/4 дюйма) от края повязки – в зависимости от того, что наступит раньше. Местный клинический протокол также должен приниматься во внимание. Наружная пленка создает внешний слой, способствующий предотвращению бактериального загрязнения раны.

Снятие повязки

Чтобы снять повязку ALLEVYN Plus Adhesive, поднимите ее за один угол и потяните в сторону самой повязки. Крестцовые повязки следует удалять от верхнего края по направлению вниз к анусу, чтобы свести к минимуму вероятность передачи инфекции.

Меры предосторожности

Не используйте повязки ALLEVYN Plus Adhesive с окислителями, такими как растворы гипохлорита (напр., EUSOL) или перекисью водорода, поскольку они могут разрушить абсорбирующий полиуретановый компонент повязки. Как и при использовании всех клейких продуктов, может возникнуть раздражение и/или мацерация кожи вокруг раны. В случае покраснения или повышения чувствительности прекратите использование. Необходимо учитывать, что ненадлежащее применение или слишком частая смена повязки, в особенности у пациентов со слабой кожей, может привести к отслаиванию кожи.

Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
66000805	12,5 см x 12,5 см (5 дюймов x 5 дюймов)	10 шт. в коробке
66000806	17,5 см x 17,5 см (7 дюймов x 7 дюймов)	10 шт. в коробке
66000807	12,5 см x 22,5 см (5 дюймов x 9 дюймов)	10 шт. в коробке
66000856	Крестцовая повязка 17 см x 17 см (6 3/4 дюйма x 6 3/4 дюйма)	10 шт. в коробке
66000857	Крестцовая повязка 22 см x 22 см (9 дюймов x 9 дюймов)	10 шт. в коробке

Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, England
 *Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выдачи 01/2015
 www.smith-nephew.com



55742